

IST 1 Questions



1. Que signifie VIH ?
 - a) Very Important Human
 - b) Virus de l'Immuno Déficience Humaine
 - c) Virus Intra Hémoglobine
2. Qu'est-ce que le SIDA ?
3. Que veut dire IST ?
4. Comment éviter de contracter une IST?
5. Faut-il mettre un nouveau préservatif à chaque rapport ?

IST 2 Questions



1. Que peut entraîner le SIDA ?
2. Pourquoi faut-il faire l'amour avec un préservatif ?
3. Est-ce qu'il faut faire le test du VIH pour arrêter le préservatif ?
4. Pourquoi devons-nous nous protéger des IST ?
5. Que veut dire « être séropositif »

IST 3 Questions



1. Y a-t-il des traitements contre les IST ?
2. Est-ce que toutes les IST sont mortelles ?
3. Comment se développe le VIH ?
4. Peut-on soigner le SIDA ?
5. Que faire si juste après un rapport le garçon ou la fille apprend qu'il/elle a le SIDA ?

IST 4 Questions



1. Comment peut-on attraper le SIDA ?
2. Est-ce qu'on peut attraper une infection avec un préservatif ?
3. Comment attrape-t-on une IST ?
4. Quelles sont les différentes IST ?
5. Peut-on guérir totalement du SIDA ?

IST2 Réponses



1. Le virus qui provoque le SIDA affaiblit notre système immunitaire, ce qui nous rend plus fragiles et plus susceptibles de contracter des maladies dites « opportunistes ». En stade terminal de la maladie, les défenses de l'organisme sont si affaiblies qu'on ne peut plus lutter contre ces maladies et on décède des suites de celles-ci.
2. Le préservatif a deux fonctions : la protection contre les IST et le risque de grossesse.
3. C'est la seule façon de savoir si on est porteur du VIH ou pas
4. Car sans parler uniquement du SIDA, les autres IST peuvent avoir des conséquences graves (septicémies, stérilité...)
5. Etre séropositif, c'est être porteur du virus VIH. Toutes les personnes infectées par le VIH ne sont pas automatiquement malades du SIDA ... **MAIS ELLE SONT SUSCEPTIBLES DE TRANSMETTRE LEUR VIRUS**

IST1 Réponses



1. b) Virus de l'Immuno Déficience Humaine
2. C'est le **Syndrome de l'Immuno Déficience Acquis**. C'est la forme la plus grave et la plus évoluée de l'infection par le VIH
3. Infection Sexuellement Transmissible
4. En se protégeant systématiquement avec un préservatif lors d'un rapport sexuel (vaginal, anal). **SEUL LES PRESERVATIFS ONT PROUVE LEUR EFFICACITE : La pilule, les spermicides, le stérilet, les implants, le retrait avant éjaculation, la pilule du lendemain ne protègent ni du VIH, ni des autres IST**
5. OUI, un préservatif est à usage unique, il ne peut être utilisé qu'une fois

IST4 Réponses



1. On doit être en contact avec une personne séropositive (porteuse du VIH mais pas forcément malade du SIDA)
Le virus sort du corps de la personne infectée par un liquide biologique : Les 5 liquides contaminants : sang (échanges de seringues souillées entre toxicomanes), sperme, liquide pré-séminal, goutte qui lubrifie le gland au début de l'érection, les sécrétions vaginales qui lubrifient le vagin, et le lait maternel.
2. NON, si celui-ci est utilisé correctement et ne craque pas
3. Lors d'un rapport sexuel (vaginal, anal, oral) non protégé
4. SIDA, hépatite B, syphilis, gonococcies, herpès génital, condylomes, chlamydiae, mycoplasmes, mycoses, trichomonas, papillomavirus.
5. Malheureusement, aucun traitement ou projet de vaccin n'a à ce jour réussi à éradiquer le VIH. Rien pour l'instant ne permet une guérison complète. Les « antirétroviraux » (ARV) luttent seulement contre la multiplication du virus en soutenant le système immunitaire. On parle de trithérapies ou multithérapies quand on associe plusieurs médicaments pour en augmenter l'efficacité

IST3 Réponses



1. OUI et on peut quasi guérir de toutes les IST... sauf le SIDA et l'hépatite B. Pour ces deux maladies, les traitements permettent de ralentir l'évolution de la maladie mais pas d'en guérir. Par contre, il existe un vaccin contre l'hépatite.
2. NON
3. Le VIH attaque certaines de nos défenses immunitaires. Il détruit certains globules blancs, les lymphocytes T4. Il entre dans ces cellules pour se multiplier et ensuite les détruit. Diminuant ainsi petit à petit les défenses, il peut envahir l'organisme, mais cela met plusieurs années.
4. Des traitements existent qui permettent de retarder un maximum l'évolution de la maladie et prolongent l'espérance de vie des personnes atteintes, mais elles ne guérissent jamais complètement, elles seront toujours porteuses du VIH.
5. La 1^{ère} chose à faire est de dire à son/sa partenaire qu'on s'est découvert séropositif pour qu'il/elle puisse rapidement aller faire un test de dépistage et éventuellement pouvoir bénéficier du traitement d'urgence (qui doit être pris dans les 48H après la prise de risque) et/ou être pris en charge rapidement s'il/elle est séropositif (ve)

IST 5 Questions



1. Est-ce que la pilule empêche une IST ?
2. Comment se transmet le VIH ?
3. Comment savoir si on a le SIDA ?
4. A partir de quel âge peut-on faire le test du dépistage du SIDA ?
5. Pouvez-vous citer des « idées fausses » à propos du VIH ?

IST 6 Questions



1. En quoi les préservatifs sont-ils fabriqués ?
2. Combien de personnes sont porteuses du VIH dans le monde ? en France ?
3. Les hépatites B et C sont-elles des IST ? que provoquent-elles ?
4. Quelles sont les IST les plus connues dans le monde ?
5. Est-ce que l'épidémie recule ?

IST 7 Questions



1. Quels sont les IST les plus graves ?
2. A quel âge peut-on avoir le SIDA ?
3. Quelles peuvent être les séquelles des IST ?
4. Existe-t-il un vaccin contre le SIDA ?
5. Peut-on encore mourir du SIDA ?

IST 8 Questions



1. Qu'est-ce qu'être séropositif ?
 - a. avoir un rhésus positif
 - b. avoir le SIDA
 - c. être porteur du virus VIH
2. Est-ce qu'on peut savoir si on est séropositif sans pratiquer le test ? Quels en sont les signes ?
3. Au bout de combien de temps après le rapport sexuel à risque peut-on faire un test de dépistage pour savoir si on est contaminé par le virus du SIDA ?
4. Citez 3 IST (Infections Sexuellement Transmissibles)

IST 6 Réponses



1. La plupart des préservatifs masculins sont fabriqués en latex (en cas d'allergies on peut en trouver en polyuréthane). Les préservatifs féminins sont en polyuréthane.
2. Dans le monde : **36,9 millions** de personnes vivent avec le VIH et **17,1 millions** ignorent qu'elles sont porteuses du VIH (données ONUSIDA 2014)
2 millions de personnes ont été nouvellement infectées en 2014 soit **5600** nouvelles infections par jour dont un tiers concerne les jeunes de 15 à 24 ans
15,8 millions porteuses du VIH ont accès à un traitement antirétroviral en juin 2014 mais **22 millions** n'ont toujours pas accès à cette thérapie.
En France : **150 000 personnes** sont porteuses du VIH (dont 30 000 à 40 000 seraient contaminées sans le savoir) et n'ont pas encore développé la maladie. Nombre de personnes nouvellement infectées en 2014 : **6584 personnes** ont découvert leur séropositivité dont 42% sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et **1500 cas** de SIDA ont été diagnostiqués
3. L'hépatite B est transmissible par les rapports sexuels, le sang, la salive. L'hépatite C est transmise par le sang uniquement. Elles peuvent évoluer vers une cirrhose (destruction progressive du foie)
4. SIDA, hépatite B, syphilis, gonococcies, herpès génital, condylomes, chlamydiae, mycoplasmes, mycoses, trichomonas, papillomavirus.
5. NON, les nouvelles contaminations dénombrées sont stables malgré, les efforts de prévention. Les seuls progrès sont pour les usagers de drogues injectables grâce aux programmes d'échanges de seringues. Les migrants d'Afrique sub-saharienne (48 pays d'Afrique noire au sud du Sahara) représentent dans le monde 40% des contaminations.

IST 5 Réponses



1. La pilule est un moyen de contraception qui empêche une grossesse mais ne protège pas d'une IST
2. On doit être en contact avec une personne séropositive (porteuse du VIH mais pas forcément malade du SIDA). Le virus sort du corps de la personne infectée par un liquide biologique : Les 5 liquides contaminants : sang (échanges de seringues souillées entre toxicomanes), sperme, liquide pré-séminal, goutte qui lubrifie le gland au début de l'érection, les sécrétions vaginales qui lubrifient le vagin, et le lait maternel.
3. En faisant un test de dépistage qui peut être réalisé dans un centre de dépistage de façon anonyme et gratuite
4. Il n'y a pas d'âge pour faire un dépistage du SIDA. Il peut être pratiqué dès que cela est nécessaire
5. Certaines croyances persistent malgré les informations. Il faut le redire : NON, le VIH ne se transmet pas par la salive, ni par la sueur, les larmes ou l'urine. NON le VIH ne se transmet pas par simple contact avec des objets quotidiens (ustensiles de cuisine, linge...) NON il ne se transmet pas non plus par l'eau des piscines, les sièges des WC, les piqûres de moustiques ou autres insectes.

IST 8 Réponses



1. c) Etre porteur du virus VIH : on a été en contact avec le virus et l'organisme réagit à l'infection en fabriquant des anticorps spécifiques.
2. On ne peut savoir si on est séropositif qu'en pratiquant le test de dépistage. La plupart du temps, lorsque l'on contracte la maladie, on ne présente pas de signes particuliers. Parfois, on peut avoir un syndrome grippal qui passe tout à fait inaperçu.
3. Si vous avez pris le risque il y a au moins 48H (rapport sexuel sans préservatif avec une personne dont vous ne savez pas si elle est séronégative, préservatif déchiré durant le rapport, partage de matériel d'injection lors d'un usage de drogues), rendez-vous le plus tôt possible aux urgences d'un hôpital, si possible avec votre partenaire, en vue d'un traitement pouvant réduire la contamination. On peut savoir 15 jours après la prise de risque si on est contaminé (e) par le virus du SIDA. On peut être certain de ne pas être contaminé (e) par le virus du SIDA que 3 mois après la prise de risque
4. SIDA, hépatite B, syphilis, gonococcies, herpès génital, condylomes, chlamydiae, mycoplasmes, mycoses, trichomonas, papillomavirus.

IST 7 Réponses



1. Elles peuvent toutes avoir des conséquences graves, mais celles qui entraînent les traitements les plus lourds sont le SIDA et l'hépatite B ; le papillomavirus également par son risque de cancer du col de l'utérus.
2. Il peut se contracter à n'importe quel âge.
3. Des septicémies, la stérilité, le cancer du col de l'utérus
4. NON
5. OUI

IST 9 Questions



1. Peut-on attraper le SIDA en embrassant un garçon ou une fille qui l'a ?
2. Peut-on attraper le SIDA en touchant une plaie d'une personne contaminée
3. Peut-on attraper le SIDA lors d'une fellation ?
4. Peut-on avoir un rapport sexuel avec une personne ayant le SIDA?

IST 10 Questions



1. Pour quelles IST existe-t-il un vaccin
2. Comment sait-on si on a une IST ?
3. Que doit-on faire si on a une IST ?
4. Est-ce qu'une IST peut se contracter dès le premier rapport ?
5. Est-ce que si le préservatif craque ou s'il n'y a pas de moyen de contraception on peut avoir une IST ?

Infos Pratiques 1 Questions



1. Les préservatifs masculin et féminin sont conseillés pour :
 - a) éviter une grossesse
 - b) éviter de contracter une IST
 - c) jouer au scrabble ?
2. Où peut-on aller pour le dépistage du VIH ?
3. Où peut-on trouver des préservatifs ?
4. Faut-il aller voir un médecin après un premier rapport sexuel ?
5. Qu'est-ce que le TROD ?

Infos Pratiques 2 Questions



1. Où faire le test pour une IST ?
2. Citez 3 services ou professionnels que l'on peut solliciter pour être conseillé après avoir eu des relations sexuelles non protégées.
3. Les parents sont-ils systématiquement prévenus en cas de grossesse ou de découverte d'IST ?
4. Connaissez-vous les associations pour les personnes atteintes du VIH ?
5. Connaissez-vous l'adresse du centre de dépistage le plus proche de chez vous ? Si non comment se le procurer ?

IST 10 Réponses



1. Pour l'hépatite B et le papillomavirus
2. C'est uniquement par dépistage sanguin ou prélèvement local qu'on peut savoir si on est atteint ou pas.
3. Aller consulter soit un généraliste, soit un dermatologue ou un gynécologue ou se rendre dans un centre de dépistage du SIDA et/ou un Centre de Planification et d'Education Familiale.
SURTOUT NE PAS ATTENDRE.
4. OUI
5. OUI, et un moyen de contraception n'y changerait rien car il ne protège pas des IST, il empêche seulement une grossesse.

IST 9 Réponses



1. **NON**, car la salive ne contamine pas (sauf lésion)
2. **OUI**, seulement si on a soi-même des lésions sur la peau
3. **OUI**, si on a une plaie dans la bouche et que le partenaire est séropositif
4. **OUI**, à condition de mettre un préservatif à chaque rapport afin d'éviter tout risque de transmission.

Infos Pratiques 2 Réponses



1. Le centre de planification et d'éducation familiale (CPEF)
2. le médecin traitant ou le gynécologue, les urgences gynécologiques hospitalières, l'infirmière scolaire, le pharmacien
3. **NON** car les médecins sont tenus au secret professionnel, tout comme les centres de dépistages ou le personnel des associations.
4. AIDES, Solidarité SIDA, SIDACTION, ACT UP. Chaque établissement indiquera et affichera les coordonnées des centres de dépistages ou regarder sur www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-de-depistage

Infos Pratiques 1 Réponses



1. a) et b) car les préservatifs permettent d'éviter une grossesse ET d'éviter les IST
Dans un Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) qui se situe souvent au même endroit ou proche du centre de planification et d'éducation familiale (CPEF). On peut également aller dans un laboratoire d'analyse traditionnel mais il sera payant et remboursé par la sécurité sociale uniquement s'il est réalisé suite à une prescription médicale et ne sera pas anonyme.
2. Pharmacies, distributeurs, centre de planification, grandes surfaces, infirmeries scolaires, distributeurs au lycée.
3. Il n'y a aucune obligation ni nécessité d'aller voir un médecin après un premier rapport sexuel, mais un suivi chez le gynécologue pour la jeune fille est conseillé dès qu'elle a une vie sexuelle régulière.
4. TROD signifie Test Rapide d'Orientation Diagnostique. Ce test permet d'avoir un résultat en 30 minutes et il est totalement fiable 3 mois (12 semaines) après une prise de risque VIH. Le test classique par prise de sang est fiable 6 semaines après la prise de risque. Depuis septembre 2015, des autotests VIH sont commercialisés dans les pharmacies françaises (entre 25 et 30€)
L'autotest est un TROD composé d'un kit complet et une notice explicative. Le prélèvement et l'interprétation sont effectués directement par l'intéressé. L'autotest présente les mêmes limites que les TROD et leur manque de sensibilité dans les phases précoces de l'infection.