

RÉPONSES

1. Réponse A

En France, en moyenne, **toutes les 12 heures**, un jeune est contaminé par le VIH. Dans le monde, toutes les minutes, ce sont 6 jeunes de moins de 25 ans qui sont contaminés par le VIH.

2. Réponse A

On peut être contaminé par le virus du SIDA en faisant un piercing ou un tatouage, si les outils ne sont pas stériles c'est-à-dire qu'ils ont déjà été utilisés.

3. Réponse B

On ne peut pas utiliser 2 préservatifs en même temps, qu'ils soient masculins ou féminins, sinon ils risquent de **se déchirer** !

4. Réponse B

La vaseline et autres crèmes grasses rendent les préservatifs **poreux**. Ils laissent alors passer le virus du Sida. Utilisez uniquement des préservatifs prés lubrifiés ou achetez un **gel lubrifiant à base d'eau** !

5. Réponse B

On peut détecter le virus à partir du **15ème jour** après l'infection.

6. Réponse A

Le traitement d'urgence peut être demandé en cas de prise de risque, il peut éviter la contamination par le VIH. Si un risque est pris, il faut se rendre **au plus vite** dans un hôpital (**maximum 48h**) pour consulter un médecin qui prescrira un traitement d'urgence gratuit. Attention : ce traitement est lourd, les effets indésirables peuvent être importants et il n'est pas efficace à 100%. Il ne remplace pas le préservatif.

Protégez vous

INSPIRER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES

ADOSEN – Prévention Santé **MGEN**
3 Square Max Hymans – 75015 Paris
adosen@mgen.fr - www.adosen-sante.com